

کجا میتوانم تست بدهم؟

اگر می خواهید در مورد روش های محافظت خود در مقابل اچ آی وی، هپاتیت ب و ث و بیماری های مقاربتی بیشتر بدانید و مورد آزمایش قرار بگیرید، می توانید به آدرس های زیر رجوع کنید.

آتن

صدای برتر
چک پوینت برای مهاجرین
200 Michail Boda, 10554
Tel: 210.32.43.133

صدای برتر
آتن چک پوینت
4 Pittaki, 10554
Tel: 210.33.10.400

دکترای جهانی
پلی کلینیک قابل مراجعه
12 Sapfous, 10553
Tel: 210.32.13.150

تسالونیکی

صدای برتر
 محل انجام چک پوینت
11 Egnatia Str, 54 622
Tel: 2310.282.284

دکترای جهانی
پلی کلینیک قابل مراجعه
29A Ptolemeon, 546 30
Tel: 2310.56.66.41

لسوس

دکترای جهانی
ارتباط با خدمات اجتماعی
socialserviceslesvos@mdmgreece.gr

ورای کشورها، و رای جوامع



این پروژه در راستای ترویج دسترسی به خدمات سلامت جمعی برای افشار آسیب پذیر می باشد که غالباً در معرض خطر ابتلاء به بیماری های عفونی می باشند. هدف این پروژه شناسایی زوینت از طریق انجام تست های سریع، گسترش افزایش آگاهی، اطلاع رسانی و ارائه مساعدة درست می باشد. در واقع این پروژه با بهترین عملکرد، خدمات خود را برای گروه ها بمنظور نابودی اچ آی وی، بیماری های مقاربتی و انواع هپاتیت های رایج، برای مهاجران، مردانی که با مردان دیگر رابطه دارند، دگرباشان و کارگران جنسی مهیا می کند.

این پروژه در چارچوب برنامه EU4Health 2021_2027 از کمیته اروپایی، با همکاری دکترای جهانی- هلند، صدای برتر- یونان پروژه dels NOMS_ Hispanosida اسپانیا، با همکاری سازمان AidsFonds هلند پیاده سازی می شود.

ایدز - اچ آی وی - هپاتیت
بیماری های مقاربتی جنسی

اطلاعات محافظت از مایش



SOAIDS
Nederland

ΔΙΑΤΡΟΦΗ
ΠΟΛΥΚΟΣΜΩΝ
DOKTERS
DE WERELD

Επική Φύση
Επική Φύση

BCN
checkpoint
SEX HEALTH



Funded by
the European Union

تفاوت ایدز و اچ آی وی

اج آی وی ویروسی است که به سیستم ایمنی بدن که از بدن در برابر عفونت‌ها و بیماری‌ها مراقبت می‌کند، حمله کرده و آن را نابود می‌کند. ایدز سندرومی است که میتواند در صورت عفونت اج آی وی مزمن، بدون استفاده از دارو اتفاق بی‌افتد و موجب نابودی کامل سیستم ایمنی بدن گردد. تا اندازه‌ای که شخص نمی‌تواند با هیچ عفونتی مبارزه کند و می‌تواند موجب مرگ شود.

روش‌های انتقال اچ آی وی

این ویروس می‌تواند در خون، اسپرم، ترشحات درون وریدی، مخاط مقعد، ترشحات ورژن و همچنین در شیر مادر وجود داشته باشد.

این ویروس می‌تواند از روش‌های زیر انتقال یابد :

داشتن سکس بدون استفاده یا استفاده نادرست از کاندوم استفاده مشترک از لوازم درون وریدی یا استنشاقی (سرنگ، نی) انجام نتو یا پیرسینگ در مکانهایی که بهداشت بطور درست رعایت نمی‌شود از مادر به نوزاد در طول روند شیر دادن

هپاتیت چیست ؟

هپاتیت اصطلاحی است که برای التهاب کبد استفاده می‌شود. هپاتیت‌های رایج از طریق ویروس‌های هپاتیت مانند، هپاتیت ب و ث بوجود می‌آیند.

راه‌های انتقال هپاتیت ب

داشتن سکس بدون استفاده یا استفاده نادرست از کاندوم استفاده مشترک از لوازم درون وریدی یا استنشاقی (سرنگ، نی و ...) از مادر به نوزاد در طول روند شیر دادن

راه‌های انتقال هپاتیت ث

در صورت داشتن رابطه جنسی با فرد مبتلا به هپاتیت ث (نه بطور معمول) استفاده مشترک از لوازم درون وریدی یا استنشاقی (سرنگ، نی و ...) تماس مستقیم با خون آلوده به هپاتیت ث در صورت تماس با سرنگ آلوده به هپاتیت ث

(STI) بیماری‌های مقاربتی جنسی

بیماری‌های مقاربتی جنسی، بیماری‌هایی است که قابل انتقال از طریق ارتباط جنسی می‌باشد. این ارتباط جنسی می‌تواند بصورت دهانی، از طریق واژن و یا مقد صورت گیرد. بیماری‌های مقاربتی نه تنها فقط از طریق ارتباط جنسی، بلکه می‌تواند از طریق تماس پوستی نیز انتقال یابند. بعضی از بیماری‌های مقاربتی عبارت اند از:

تبخال‌های آلت تناسلی _ تریکومونیازیس _ هپاتیت ب _ هپاتیت ث _ ایدز _ HPV زگل _ ولینور‌ها _ اچ آی وی _ آبله _ کلامیدیا _ سوزاک

چگونه از خود محافظت کنم ؟

من از انجام آزمایش‌های پیش‌گیرانه نمی‌ترسم

تست سریع برای هپاتیت/ اچ آی وی و آبله بیشتر از ۱۵ دقیقه از وقت شما را نخواهد گرفت.

بیماری‌های مقاربتی عالمی را بوضوح نشان نمی‌دهند و اگر نشان دهند، آنها را بطور خاص مشخص نمی‌کنند. انجام بررسی‌های مداوم من را این خواهد ساخت.

آگاه بودن برابر با محفوظ بودن

آموزش جوانان درباره راه‌های حفاظت از خود آشنایی دقیق‌تر با طریقه‌ی انجام تست‌های سریع و تست‌های آزمایشگاهی انجام مشاوره بمنظور داشتن روابط جنسی ایمن و کاهش ابتلا به بیماری

من تمام راه‌های پیشگیری را می‌آموزم

تزریق واکسن هپاتیت ب در دوران کودکی و انجام دوباره این واکسن‌ها در میانسالی در مورد درمان پیشگیرانه اچ آی وی و همچنین درمان پیشگیرانه احتمال ابتلا به اچ آی وی مطلع می‌باشم.

استفاده درست و منظم از کاندوم در هنگام رابطه جنسی

استفاده از کاندوم یکی از مؤثرترین روش‌های حفاظت در مقابل بیماری‌های مقاربتی و اچ آی وی می‌باشد، مدامی که استفاده از آن همیشگی و در تمام حالات مقاربه جنسی باشد. با استفاده از سرنگ‌های ضدغونی شده درون وریدی از انتقال این بیماری جلوگیری خواهم کرد.

سرنگ و سوزن و سایر لوازم بهداشتی خود را با دیگران استفاده نخواهم کرد.